


iStent  
inject® W



## iStent inject® W KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW




### Kryteria kwalifikacji pacjentów do wszczepienia iStent inject® W

- Łagodna lub umiarkowana jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania (POAG), jaskra pseudoeksfoliacyjna lub jaskra barwnikowa
  - Współczynnik C/D  $\leq 0,8$
  - Ciśnienie wewnątrzgałkowe przed operacją nie większe niż 30 mmHg (pacjenci stosujący krople)
  - Docelowe pooperacyjne ciśnienie wewnątrzgałkowe do 15 mmHg
- Pacjenci fakijni lub pseudofakijni z soczewkami tylnokomorowymi
- Pacjenci mający trudności ze stosowaniem kropli do oczu
- Pacjenci, u których wystąpiły skutki uboczne lub powikłania w wyniku stosowania kropli przeciwjaskrowych (suche oko, czerwone oko, toksyczne lub alergiczne reakcje)
- Pacjenci mający trudności z przestrzeganiem zaleceń dotyczących przyjmowania leków
- Pacjenci, którzy skorzystają na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego i/lub zmniejszeniu dawki kropli przeciwjaskrowych
- Prawidłowa anatomia kąta na podstawie gonioskopii; klasyfikacja Schaffera: 3-4
- Brak obwodowych zrostów przednich (PAS), rubeozy tęczówki lub innego rodzaju nieprawidłowości kąta mogących utrudnić prawidłową implantację iStent inject® W

# DOKONAJ ISTOTNEJ NA CAŁE ŻYCIE ZMIANY DZIĘKI MIKROINWAZYJNEMU ZABIEGOWI CHIRURGICZNEMU U PACJENTÓW CIERPIĄCYCH NA JASKRĘ, U KTÓRYCH MOŻE WYSTĘPOWAĆ ZAĆMA.

## Miniaturowy implant. Wielka zmiana.

- Zaprojektowany do ciągłej pracy w celu poprawy odpływu cieczy wodnistej poprzez naturalną fizjologiczną drogę odpływu
- Ułatwia utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oku
- Może ograniczyć lub wyeliminować konieczność przyjmowania leków na jaskrę zgodnie z decyzją okulisty
- Ogólny profil bezpieczeństwa podobny do zabiegu usunięcia zaćmy



**GLAUKOS**  
TRANSFORMING VISION



GLAUKOS CORPORATION  
229 Avenida Fabricante • San Clemente, CA • 92672 • USA  
tel. +1.949.367.9600 • faks +1 949 367 9984 • Glaukos.com

 Polymed Polska

DYSTRYBUTOR:



**WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA.** iStent inject® W jest przeznaczony do bezpiecznego i skutecznego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów, u których zdiagnozowano jaskrę pierwotną z otwartym kątem przesączania, jaskrę pseudoeksfoliacyjną lub jaskrę barwnikową. iStent inject® W umożliwia wszczepianie dwóch (2) stentów przy jednym podejściu poprzez jedno cięcie. Implant jest zaprojektowany do stentowania przejścia przez siatkę bełczkowania, co pozwala na zwiększenie łatwości odpływu, a następnie obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Urządzenie jest bezpieczne i skuteczne, gdy jest wszczepiane w połączeniu z operacją zaćmy u osób, które wymagają obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego i/lub odniosłyby korzyść ze zmniejszenia dawki leków przeciwjaskrowych. Urządzenie może być również wszczepiane pacjentom, u których nadal występuje podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, pomimo wcześniejszego leczenia lekami przeciwjaskrowymi i konwencjonalnej operacji jaskry.